



Información proporcionada por Ministerio de Salud

Vacunas del Programa Nacional de Inmunizaciones del Minsal

Última actualización: 06 enero, 2026

Descripción

Las vacunas del Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsal) son **obligatorias** y **gratuitas** para cada grupo objetivo que vive en Chile (ver [decreto Nº 50, de 2021, y sus posteriores modificaciones](#)), independiente del tipo de previsión de salud (Fonasa o Isapre).

Estas vacunas están disponibles en todos los vacunatorios públicos y privados en convenio con las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremi) de Salud.

[**Revisa el calendario 2026 del Programa Nacional de Inmunizaciones \(PNI\).**](#)

Vacunación embarazadas

Embarazadas desde las 28 semanas de gestación:

- **dTp (acelular)**: protege contra la Difteria, Tétanos, y [Tos Convulsiva o Coqueluche](#).



- **BCG** (única dosis): protege contra la Meningitis Tuberculosa y la forma diseminada de la enfermedad.
- **Hepatitis B** (única dosis).

2 (primera dosis) y 4 meses (segunda dosis):

- **Meningocócica Serogrupo B**: protege contra la bacteria *Neisseria meningitidis* serogrupo B (lactantes nacidos a partir del 1 de mayo de 2023).

2 (primera dosis), 4 (segunda dosis) y 6 meses (tercera dosis):

- **Hexavalente**: protege contra la Difteria, Tétanos, [Tos Convulsiva o Coqueluche](#), enfermedades invasoras por *Haemophilus Influenzae* (tipo B), infección por virus de Hepatitis B y virus Polio.
- **Neumocócica conjugada 13 valente**: protege contra enfermedades causadas por *S. Pneumoniae*, incluyendo Sepsis, Meningitis, Neumonía, Bacteriemia y Otitis media aguda, a todos los y las lactantes de dos y cuatro meses. La tercera dosis, que se coloca a los 6 meses, se administra solo a los prematuros y prematuras.

12 meses:


- **Tres Vírica** (primera dosis): protege contra el Sarampión, Rubéola y Parotiditis.
- **Meningocócida conjugada tetravalente** (única dosis): protege contra enfermedades causadas por *Neisseria Meningitis* de los grupos A, C Y y W135.
- **Neumocócica conjugada 13 valente** (refuerzo): protege contra enfermedades causadas por *S. Pneumoniae*.

18 meses:

- **Hexavalente** (refuerzo): protege contra la Difteria, Tétanos, [Tos Convulsiva o Coqueluche](#), enfermedades invasoras por *Haemophilus Influenzae* (tipo B), infección por virus de Hepatitis B y virus Polio.
- **Hepatitis A** (única dosis).
- **Varicela** (primera dosis).
- **Fiebre amarilla** (única dosis, se administra exclusivamente en Isla de Pascua).
- **Meningocócica Serogrupo B** (refuerzo): protege contra la bacteria *Neisseria meningitidis* serogrupo B (lactantes nacidos a partir del 1 de mayo de 2023).

36 meses:

- **Tres Vírica** (segunda dosis): Sarampión, Rubéola y Parotiditis.
- **Varicela** (segunda dosis).



- **dTp (acelular)** refuerzo: protege contra la Difteria, Tétanos, y [Tos Convulsiva o Coqueluche](#).

Cuarto básico:

- **Virus Papiloma Humano (VPH) nonavalente** (única dosis): protege contra infecciones causadas por el VPH por los serotipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58.

Octavo básico:

- **dTp (acelular)** refuerzo: protege contra la Difteria, Tétanos, y [Tos Convulsiva o Coqueluche](#).

Vacunación adultos mayores

Personas mayores de 65 años:

- **Neumocócida polisacárida 23 valente** (única dosis): contra enfermedades invasoras por *S. Pneumoniae*.



Las vacunas protegen a la comunidad de enfermedades peligrosas que pueden tener complicaciones graves o secuelas, y provocar incluso la muerte. Algunas de estas enfermedades son muy poco frecuentes, debido precisamente, a la administración de las vacunas y campañas de vacunación.

¿Las vacunas pueden generar reacciones después de ser administradas?

Las personas pueden presentar algunas reacciones, en general leves y transitorias. Las más comunes son:

- Fiebre con temperatura mayor a 37,5° C.
- Inflamación, enrojecimiento, y dolor o aumento de volumen en la zona de punción.
- Decaimiento.

Los síntomas pueden durar desde las primeras 24 horas hasta tres días. Si presentas otra manifestación o las reacciones se prolongan por muchos días, consulta a tu médico o acude al servicio de urgencia más cercano.

¿Puedo vacunar a mi hija o hijo si está enfermo?

Las vacunas no están contraindicadas cuando se presenta alguna de las siguientes manifestaciones:

- Fiebre menor a 38° C.
- Infecciones leves del tracto respiratorio.
- Diarreas leves.

Solo se deben postergar las vacunas si se trata de una enfermedad grave en evolución, alergia a un componente de la vacuna, o contraindicación diagnosticada por una o un médico.

¿Se puede recibir más de una vacuna al mismo tiempo?

Sí, utilizando distintas zonas de punción. En algunos casos, dependiendo de la edad, se puede recibir por vía oral (actualmente, solo la vacuna contra el Rotavirus).

Obtén más información

Si tienes dudas o consultas:

- Llama a [Salud Responde](#), al 600 360 77 77 (disponible las 24 horas, todos los días).
- Revisa el [sitio web del departamento de vacunas e inmunizaciones del Ministerio de Salud \(Minsal\)](#).